

オピオイド量換算の目安

注意:年齢・体格・呼吸数に応じて適宜加減すること

成分	製品名	採用規格	投与量/日						
モルヒネ	MSコンチン錠・モルベス細粒	錠10mg*・細粒10mg包	10mg		20mg	30mg	60mg	120mg	180mg
	アンベック坐剤	10mg・30mg			10~20mg	20mg	40mg	80mg	120mg
	モルヒネ塩酸塩注射液	10mg/1mL・50mg/5mL	~5mg	5~10mg	10~15mg	20~30mg	40~60mg	60~90mg	
オキシコドン	オキシコドン徐放錠	5mg・10mg・20mg・40mg	10mg	15mg	20mg	40mg	80mg	120mg	
	オキシコドン注射液	10mg/1mL・50mg/5mL			15mg	30mg	60mg	90mg	
フェンタニル	フェンタニル注射液	0.1mg/2mL・0.25mg/5mL	~0.1mg	0.15mg	0.2mg	0.3mg	0.6mg	1.2mg	1.8mg
	当院採用フェンタニル貼付剤※①	1mg・2mg・4mg*・6mg		0.5mg		1mg	2mg	4mg	6mg
コデインリン酸塩	コデインリン酸塩散	0mg/g(非麻薬)・100mg/g(麻薬)	60mg	90mg	120mg	180mg	360mg		
トラマドール	トラマールOD錠・ワントラム錠	25mg・100mg	50mg	75mg	100mg	150mg	300mg		
	トラムセット配合錠 (トラマドール37.5mg+アセトアミノフェン325mg)								
タペンタドール	タペンタ	50mg・100mg		50mg		100mg	200mg	400mg	600mg
ヒドロモルフォン	ナルサス錠※②	2mg・6mg・12mg・24mg*	2mg		4mg	6mg	12mg	24mg	36mg
	ナルベイン注※②	2mg/1mL・20mg/2mL	0.4mg	0.6mg	0.8mg	1.2mg	2.4mg	4.8mg	7.2mg

レスキュー 1回量

成分	製品名	採用規格	投与量/回						
モルヒネ	オープン内用液	5mg・10mg*	(5mg)		(5mg)	5mg	10mg	20mg	30mg
	モルヒネ塩酸塩錠	10mg					10mg	20mg	30mg
	モルヒネ塩酸塩注射液	10mg/1mL・50mg/5mL	1時間量フラッシュ						
オキシコドン	オキノーム散	2.5mg・5mg・10mg・20mg			(2.5mg)	2.5mg	5mg	12.5~15mg	20mg
	オキシコドン注	10mg/1mL・50mg/5mL	1時間量フラッシュ						
フェンタニル	フェンタニル注	0.1mg/2mL・0.25mg/5mL	1時間量フラッシュ						
トラマドール	トラマールOD錠	25mg	25mg	25mg	25mg	50mg	50mg		
ヒドロモルフォン	ナルラビド錠	1mg・2mg・4mg	1mg	1mg	1mg	1mg	2mg	4mg	6mg
	ナルベイン注	2mg/1mL・20mg/2mL	1時間量フラッシュ						

※①はオピオイド初回投与から使用可能だが、その際は0.5mgより開始すること
 ※②は用事限定採用（院内在庫がない場合あり）
 *は用事限定採用（院内在庫がない場合あり）
 *斜体は院外限定採用

2020年12月 東北大学病院 緩和ケアチーム監修

ンからナルサスに変更する場合:ナルベイン1mg⇒ナルサス2.5mgと換算する

